

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Искусственное прерывание беременности (аборт) – это удаление уже образовавшегося плодного яйца, независимо от сроков, способов и размеров плода. Аборт – противоестественный шаг, наносящий огромный вред здоровью женщины.

Федеральный закон РФ от 21.11.2011г ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» статья 567 предоставляет право женщине самостоятельно решать вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины, при наличии информированного согласия:

- при сроке беременности 4-7 недель;
- при сроке беременности до 12 недель.

При сроке беременности 8-10 недель женщине дается «неделя тишины» для обдумывания своего решения.



Аборт вреден для здоровья, опасен для жизни, ставит под угрозу возможность материнства.

Не хотите забеременеть – предохраняйтесь.

Существуют всем доступные методы постоянной, временной и экстренной контрацепции.

Только врач, учитывая все индивидуальные особенности организма, поможет правильно подобрать способ контрацепции.

Все проблемы можно и нужно решать заранее, отвечая за свое здоровье и здоровье будущих детей.

MAMA,
НЕ УБИВАЙ МЕНЯ!

НЕ ДЕЛАЙ
АБОРТ!

Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

Последствия аборта:

1. Кровотечения
2. Хронические воспалительные процессы половых органов
3. Бесплодие
4. Дисфункция яичников
5. Невынашивание беременности
6. Внематочная беременность
7. Онкологические заболевания половых органов и молочных желез



Основное предназначение женщины и истинная ценность ее жизни - родить ребенка, выразить себя в любви, воспитании и развитии человеческой личности и обрести свое будущее.
Не лишайте себя счастья материнства.


Срок беременности в неделях	Внутриутробное формирование ребенка
4	Сформирована голова, ручки, ножки, кровообращение зародыша
8	На УЗИ видны глаза, уши. Формируются легкие, желудок, мышцы, скелет, нервная система плода
12	Присутствуют все важные органы, начинает делать движения, глотать, сердцебиение прослушивается стетоскопом
16	На УЗИ хорошо видны все части тела, лицо. Может моргать, открывать рот
20	Все органы плода сформированы, начинается бурный рост головного мозга. Появляются волосы на голове и телеце. Сосет палец
24	Ребенок реагирует на звуки, он слышит маму. Развитие продолжается, кожа становится красноватой, появляются морщинки
29	Ритмичное дыхание и температура тела контролируется головным мозгом. Дети, родившиеся на этом сроке уже жизнеспособны
34	Нарастает тонус мышц, ребенок способен поворачивать голову
38-40	Ребенок достаточно развит и готов к рождению. Рост-50 см, вес – от 2,6-4 кг

В России только 25% женщин детородного возраста используют современные методы контрацепции

Следовательно, 75% женщин подвергают себя риску нежелательной беременности



Рождение семьи часто сочетается с рождением ребенка, тогда один совет: явка в женскую консультацию как можно раньше. В настоящее время процент врожденных пороков развития плода очень велик. Но этого можно избежать.



Беременность нужно планировать за 3 месяца обоим супружам, так как генетическим материалом в равной мере обеспечивают плод оба супруга. Обследование до беременности у женщины дает возможность выявить заболевания и вылечить, что поможет избежать осложнений во время беременности и родов.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
Женская консультация №2



ГУЗ «Елецкая городская больница №2»

г. Елец, ул. Гагарина, д. 5 больница2.рф

По интересующим вас вопросам
обращаться по телефонам:
8(47467) 4-45-43
8(47467) 4-45-64

Скрининг на врожденную патологию плода:


УЗИ №1 в сроке 11-14 недель беременности и кровь на биохимический скрининг проводится в АПД Г/З «ЛОПЦ». Запись в женской консультации по электронной регистратуре.

УЗИ №2 в сроке 19-21 неделя проводятся в АПД ГУЗ «ЛОПЦ», УЗИ №3 в сроке 32-34 недели по месту жительства.

Паре необходимо исключить в период подготовки к беременности все вредные привычки: наркотики, курение, алкоголь (пиво, включает в себя эстрогеноподобные соединения, что нарушает сперматогенез).

Мужчинам исключить перегрев репродуктивных органов, что также вредит сперматогенезу. Консультация уролога при необходимости.

Паре необходима нормализация режима дня: сон не менее 8 часов. Ежедневно необходимо включать в рацион питания не менее 120 гр. белка, 350 гр. рыбы в неделю. Желательно употреблять в пищу продукты, обогащенные фолиатами, йодом, железом, витамином D полиненасыщенными жирными кислотами.



РОДИТЕЛЬСТВО
наш ГЛАВНЫЙ
жизненный проект

*Беременность должна быть планируемой,
а рожденный ребенок желанным и любимым*

ВЛИЯНИЕ АБОРТА НА ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

Под понятием «аборт» понимается процесс прерывания беременности.

Различают **самопроизвольный аборта** (выкидыш) и **искусственный**, подразумевающий медицинское вмешательство в процесс течения беременности.

АБОРТЫ

Ранние (до 12 недель)

- Вакуумный (мини-аборт)
- Медикаментозный (таблетированный)
- Хирургический (инструментальный)



Поздние (до 28 недель)

- Происходят по медицинским показаниям, когда возникает опасность для здоровья и жизни женщины.
Методы: консервативные (провокация выкидыша) и хирургические



После 28 недель (условный срок жизнеспособности плода вне тела матери) плод уже именуется ребенком, а прекращение беременности - преждевременными родами: искусственными или самопроизвольными

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ АБОРТОВ

- травмирование шейки и тела матки (перфорация) при хирургическом прерывании беременности;
 - маточное кровотечение;
 - острые хронические воспалительные заболевания матки и маточных труб, развитие спаечного процесса в маточных трубах, частичная или полная их непрходимость;
 - нарушение менструального цикла;
 - невынашивание последующих беременностей;
 - психические нарушения;
 - бесплодие;
 - особенно опасен аборт женщинам с отрицательным резус-фактором, так как следующие после аборта беременности могут осложниться гемолитической болезнью плода и новорожденного, связанной с иммунным конфликтом между резус-положительным плодом и резус-отрицательной матерью.
- С каждой беременностью этот конфликт обостряется.



БОЙТЕСЬ АБОРТОВ! ЧАЩЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Если беременность нежелательна, врач научит вас предохраняться, чтобы не пришлось прибегнуть к операции. Посоветуйтесь с гинекологом, прежде чем решиться на аборта, а не после него, когда ни мольбы, ни слезы, ни искреннее желание врача помочь зачастую не в силах вернуть женщине способность стать матерью, утраченное здоровье, а может быть и жизнь.

"Постабортные" отцы

Мужчина – защитник, кормилец, отец. Аборт разрушает эти мужские роли. **Аборт – это убийство!** Принуждая женщину к аборту, а своего ребенка – к смерти, мужчина осознанно подписывает приговор: «На меня нельзя положиться, мне нельзя доверять, я слабый, я не могу прокормить своих детей. Я не мужчина». Женщина же, в свою очередь, соглашаясь на аборта, не чувствует опоры, «надежного плеча» со стороны своего мужчины.

Задумайтесь! Женщина, жена, мать никогда не выберет аборта, если будет чувствовать поддержку своего мужчины, мужа, отца.

Влияние аборта на пару:

1. Ухудшение отношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой;
2. Отвержение мужской роли. Мужчина теряет статус главы семьи;
3. Снижение половой активности, как у мужчины, так и у женщины;
4. Потеря доверия в отношениях;
5. Чувство утраты и чувство вины в последующем перерастает в агрессию, депрессию, может стать предвестниками алкоголизма, наркомании, появления суицидальных мыслей.

Папа, сохрани мне жизнь!

В тебе незримо зреет чудо,
Комочек счастья, свет во мгле.
Он - человек и нужен людям.
Родней не будет на земле!

Если тест на беременность показал две полосочки, не сомневайся в том, что ты УЖЕ стала мамой. Впереди еще долгий путь, удивительное путешествие, которое нужно пройти вдвоем. Он или она еще совсем крошка, но, ты только представь, с момента зачатия уже известно, какого цвета у малыша глаза и волосы, какими чертами характера он будет обладать. Ты стала целым миром и даже вселенной для маленького существа, которого на земле никогда еще не было и никогда больше не будет.

ТЫ СЛЫШАЛА, ЧТО НА МАЛЕНЬКОМ СРОКЕ – ЭТО ЕЩЕ НЕ ЧЕЛОВЕК, А ТОЛЬКО ГУСТОК КЛЕТОК. НЕ ВЕРЬ!

В четыре недели у ребенка уже сформирована голова, формируются ножки, ручки, бьется маленькое сердечко.

В шесть недель сердце имеет четыре отделения. Можно различить глаза, уши, челюсть. Формируются легкие, желудок и печень.

В двенадцать недель малыш начинает глотать. Сформированы веки малыша. Почки производят мочу. Можно определить пол ребенка. Он засыпает и просыпается с мамой.

Время пролетит очень быстро, и когда новорожденный комочек счастья прижмется к тебе с огромной любовью, ты поймешь, что **НЕТ НИКОГО ДОРОЖЕ И РОДНЕЕ!**



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО СТОИТ ЗА СЛОВАМИ "АБОРТ", "ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ" ?

Существует несколько видов операций по прерыванию беременности.

1. Мини-аборт. В полость матки вводится трубка от вакуумаспиратора, в котором создается отрицательное давление для отсасывания ребенка. Аппарат мгновенно умерщвляет его и отправляет в банку для отходов (мини-аборт). На более поздних сроках беременности тело малыша разрывается на части и удаляется из матки путем выскабливания.

2. Аборт. Ребенка расчленяют и удаляют из матки с помощью специального петлеобразного ножа. Если срок беременности превышает 10-11 недель, голову ребенка раздавливают щипцами, иначе ее невозможно удалить.

Как и предыдущий, этот аборт совершается вслепую, в результате чего у каждой четвертой женщины травмируется мышечный слой матки, причем поврежденный участок не восстанавливается. Возможно прободение матки.

3. Малое кесарево сечение - при беременности до 27 недель. Дети на таком сроке часто жизнеспособны, они плачут, сучат ножками, двигают ручками. Таких детей умерщвляют.

4. Отравление солями. В околоплодный пузырь вводятся концентрированные растворы поваренной соли или глюкозы, под действием которых ребенок погибает мучительной смертью, в агонии. Через несколько часов начинается родовая деятельность и ребенок изгоняется из матки. Последствия для женщины - гипертониция (повышенное содержание натрия в крови), характеризующаяся головными болями, болями в груди, падением артериального давления, шоком, разрушением эритроцитов. Иногда наступает смерть.

5. Искусственные роды. Внутривенно вводятся простагландины, вызывающие родовую деятельность. На большом сроке беременности ребенок может родиться живым - чтобы затем погибнуть. У 30% женщин при применении простагландинов отмечаются тошнота, рвота, боли в области желудка, бронхоспазм, урежение сокращений сердца, падение артериального давления, сильные маточные кровотечения.

АБОРТ

ЕДИНСТВЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ, КОТОРАЯ НАНОСИТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.

На любом сроке беременности он является убийством ребенка. Следствием его бывает болезнь, а иногда и смерть женщины.

Поскольку с первых мгновений беременности организм будущей матери настроен на сохранение ребенка, аборт является биологической травмой.

Кровотечение, травма шейки и тела матки, перитонит, заражение крови, воспалительные и онкологические заболевания яичников, матки, молочных желез, тяжелая психическая травма - таков перечень близких и отдаленных осложнений. Во время аборта в матку попадает инфекция - причина кокковых инфекций новорожденных.

Матка, словно рыхлая земля, готова принять в себя зачатого ребенка. После выскабливания на ней остаются рубцы. Новый зачатый ребенок попадает уже в израненный орган.

Результатом предшествующего аборта могут явиться бесплодие, внематочная беременность, выкидыши, преждевременные роды, рождение ослабленных, больных детей.





КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕЛАНИЕМ,
А БЕРЕМЕННОСТЬ – ЗАПЛАНИРОВАННОЙ

МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ: ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ВОЗДЕРЖАНИЕ

ВРЕМЕННОЕ ИЛИ ДЛЯТЕЛЬНОЕ
100% — ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- + - НЕ ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
- НЕ ТРЕБУЕТ ПОМОЩИ ВРАЧА
- ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВСЕМИ КОНФЕССИЯМИ
- - НЕОБХОДИМОСТЬ ОГРАНИЧИВАТЬ СЕБЯ

СПЕРМИЦИДЫ

85% — ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- + - МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЛЮБОЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
- МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДЛЯТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ И СОЧЕТАТЬ С ДРУГИМИ ВИДАМИ КОНТРАЦЕПЦИИ
- - НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ 10-15 МИНУТНОГО ИНТЕРВАЛА ПЕРЕД КАКИМ ПОЛОВЫМ АКТОМ

ПРЕЗЕРВАТИВ

85-99% — ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- + - ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ И ВИЧ
- ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
- ПРОДАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА
- ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
- - ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗРЫВА И «СПОЛЗАНИЯ» ПРЕЗЕРВАТИВА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ МЕСТНОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ
- ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВЫ
- НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ КАЖДОМ ПОЛОВОМ КОНТАКТЕ

ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ

99,9% — ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- + - ХОРОШАЯ ПЕРЕНОСИМОСТЬ
- ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
- РЕГУЛЯЦИЯ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
- БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К ЗАЧАТИЮ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЕМА
- БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
- УМЕНЬШЕНИЕ БОЛИ ПРИ МЕНСТРУАЦИИ
- УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КОЖИ
- - ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЕМ ПРЕПАРАТА
- ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ
- ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ТОШНОТА, УВЕЛИЧЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА
- НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВИЧ И ИППЛ

СПЕЦИАЛИСТ ПОМОЖЕТ ВЫБРАТЬ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ, УЧИТЫВАЯ ВАШЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ

Чтобы остановить демографический кризис в России, каждая пара должна родить и воспитать 3-4 ребенка

В этих условиях репродуктивное здоровье молодежи — залог национальной безопасности России

АБОРТ – ЭТО НЕ МЕТОД КОНТРАЦЕПЦИИ!

АНФ
РОДИЛСЯ УДАЧА



К путям снижения частоты абортов и их осложнений относятся:

- расширение процесса информированности населения по предупреждению нежелательной беременности;
- поддержка ответственных добровольных решений о деторождении, методах регуляции fertильности по личному выбору;
- содействие в вопросах образованности и выбора средств и методов контрацепции;
- широкое внедрение эффективных средств и методов контрацепции для профилактики абортов, особенно среди женщин групп риска (подростки, женщины после аборта и родов);
- повсеместная доступность квалифицированной медицинской помощи женщинам, вынужденным прибегать к прерыванию беременности;
- внедрение в практику консервативных (фармакологических) методов прерывания беременности в ранние сроки;
- снижение частоты криминальных абортов путем повышения информированности о законодательных актах и регламентирующих документах по искусственноному прерыванию беременности в средствах массовой информации, методических материалах и специальной литературы для населения;
- прерывание беременности в поздние сроки и лечение женщин с серьезными осложнениями абортов в многопрофильных стационарах, располагающих всеми возможностями для оказания квалифицированной ургентной помощи в полном объеме с использованием современных технологий с целью снижения материнской смертности от абортов;
- динамическое наблюдение женщин после прерывания беременности.

Осложнения аборта:

- **Перфорация матки** - травма стенок матки хирургическими инструментами, вводимыми в полость матки. В случае неполной перфорации возможно консервативное лечение. Если же было нанесено проникающее повреждение стенки матки, то требуется хирургическое лечение
- **Кровотечение** может развиться либо вследствие травмы стенок полости матки и её сосудов, либо вследствие остатков плодного яйца в полости матки, либо вследствие нарушения свёртывающей системы крови. Нарушения свёртывающей системы крови могут быть исходно у женщины (не диагностируемые раньше) или развиться в результате осложнения операции (например, при инфицированном аборте). Кровотечение часто требует повторного выскабливания стенок полости матки
- **Остатки плодного яйца в полости матки.** Наличие остатков частей плодного яйца в полости матки требует повторного выскабливание стенок полости матки и проведения антибактериальной терапии, т.к. при наличии остатков плодного яйца возможно развитие инфекционного процесса
- **Гематометра.** Гематометрой называют скопление сгустков крови в полости матки. Данное осложнение возникает при затруднении опорожнения матки, которое может быть вследствие спазма шейки матки или при загибе матки
- При выполнении хирургического аборта возможны осложнения, связанные с наркозом. В результате любого хирургического вмешательства существует риск инфицирования гепатитами, ВИЧ-инфекцией и др.
- **Инфицированный аборт.** Аборт, при котором произошло инфицирование организма женщины и возникло местное или общее воспаление, называется инфицированным. Инфекция, как правило, развивается при внебольничном (криминальном) прерывании беременности. Симптомами инфицированного аборта являются: повышение температуры, озноб, кровянисто-гнойные выделения из половых путей, болезненность внизу живота. При инфицированном аборте воспалительный процесс может ограничиться только маткой или распространится за её пределы. К осложнениям инфицированного аборта относятся воспаление слизистой оболочки матки (эндометрит), воспаление окломаточной клетчатки (параметрит), воспаление придатков матки (сальпингоофорит), воспаление брюшины малого таза (пельвиоперитонит), сепсис, септический шок. Необходима срочная госпитализация и интенсивная терапия таких пациенток