




# Памятка для населения Корь у взрослых



Корь – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является вирус.

Заболевание передается воздушно-капельным путем.



Источник инфекции – больной корью человек, выделяющий вирус с последних 2 дней инкубационного периода до 4-го дня после высыпания.

В зоне риска взрослые не привитые и не переболевшие.

## Отличие кори у взрослых от кори у детей

- Температуры тела очень высокая 40С-40,5С.
- Резкое ухудшение самочувствия, человеку моментально требуется постельный режим.
- Высыпания очень интенсивные, покрывают все тело, этапность появления сыпи сохраняется как и у детей.
- У взрослых корь протекает тяжело, чаще всего с ларингитом, бронхитом, иногда осложняется пневмонией и менингоэнцефалитом.
- Более медленное выздоровление и восстановление, чем у детей.
- Корь у взрослых в большинстве случаев требует госпитализации больного.

Что делать, если прививка от кори не была сделана в детском возрасте?

В таком случае прививку от кори можно сделать до 30 лет. В этом случае решение о необходимости проведения вакцинации принимает участковый терапевт, так как некоторые просто не знают своего прививочного статуса.

Что делать, если в детстве была сделана одна прививка из положенных двух?

Это незаконченная прививка, а значит, вакцина не даст положительного результата. То есть, она фактически не действительна.

Можно ли утверждать, что вакцинация полностью исключает возможность заболевания корью?

Да, но при условии, что она была сделана вовремя и как положено.

Что делать если контактировал с больным корью, а ранее не был привит?

Необходимо в течение трех дней обратиться в поликлинику к своему лечащему врачу терапевту для уточнения своего прививочного статуса и получения консультации по профилактике заболевания

Какие есть дополнительные меры профилактики кори?

- стараться избегать мест с большим скоплением людей, если этого нельзя избежать, то пользуйтесь марлевой повязкой;
- после пребывания в людных местах тщательно мойте руки с мылом;
- не касайтесь лица руками.

Обратное развитие элементов сыпи начинается с 4-го дня высыпаний: температура нормализуется, сыпь темнеет, буреет, пигментируется, шелушится (в той же последовательности, что и высыпания). Пигментация сохраняется 1-1,5 недели.

## *Знайте!*

Инкубационный период (время от заражения до появления клинических признаков болезни) при кори составляет от 9 до 21 дня, поэтому болезнь может проявиться по прибытии домой. Если в течение 3 недель после возвращения из-за границы у Вас появились признаки инфекционного заболевания, необходимо сообщить врачу, в какой стране и когда Вы там находились.

## **К**ак защититься от кори?

**КОРЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФЕКЦИЕЙ, КОТОРАЯ УПРАВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВАМИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ.**

За период с 2000 по 2013 год противокоревая вакцинация в мире привела к снижению смертности от кори на 75% и предотвратила 15,6 миллионов случаев смерти, сделав вакцину от этой инфекции одним из наиболее выгодных достижений общественного здравоохранения.

**В СООТВЕТСТВИИ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КАЛЕНДАРЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ** ребенок бесплатно получает две прививки против кори: в 12 месяцев и перед школой в 6 лет.

Взрослые прививаются бесплатно по эпидемическим показаниям при наличии вероятного контакта с заболевшим корью. Все остальные взрослые, не болевшие корью, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках, могут получить прививку против кори на платной основе.

## *Помните!*

**СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭТОЙ ИНФЕКЦИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ПОЭТОМУ ЕЕ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.**

Планируя выезд за границу, уточните свой прививочный статус и, при необходимости, сделайте прививку против кори.

**Вовремя сделанная прививка гарантирует защиту от кори!**



ГУ "Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

ГУ "БЦГЭОБ". Свид. о регистрации № 1021 от 01.10.2014г., стр. 132, стр. 208 стр., 2017г.

# КОРЬ



## вакцинация защитит



**ПАМЯТКА ТУРИСТУ**

# Иммунопрофилактика кори

Прививки против кори проводят контактировавшим с больным (больными) в очагах кори лицам в возрасте от 12 мес. до 35 лет, ранее не привитым или однократно привитым и не болевшим этой инфекцией.

Прививки по эпидемическим показаниям в очагах кори проводят не позднее 72 ч с момента выявления первого случая заболевания в очаге.

