

ВНИМАНИЕ – ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ!

Ежегодно в летне-осенний период регистрируется заболеваемость среди населения энтеровирусными инфекциями, в том числе серозным менингитом.

Это группа вирусных инфекционных болезней человека, характеризующаяся разнообразными клиническими проявлениями.

СИМПТОМЫ:

При всех формах резко повышается температура до 38-39°, могут быть герпетические высыпания в зеве, приступообразные боли в мышцах, иногда развивается картина серозного менингита (головная боль, рвота).

Заболевание может протекать в виде стоматита, ларингита. Может иметь картину схожую с заболеванием краснухой и корью (сыпь). Картина заболевания иногда протекает с симптомами энтероколита (появляется диарея, боли в животе). Иногда заболевание протекает в форме полиомиелита с вялыми параличами и парезами конечностей.



МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

ОСНОВНАЯ МЕРА –
изоляция заболевшего инфекционным заболеванием в больницу или отдельную комнату.

Необходимо проведение дезинфекционных мероприятий (дезинфекция посуды, туалетов).



Комитет
здравоохранения
Администрации
города Тюмени

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ:

Человек, больной энтеровирусной инфекцией или носитель.


Передача инфекции в основном идет через пищу и воду.

Особенно часто через овощи, фрукты.

Не исключается и воздушно-капельный путь передачи.





ВОЗБУДИТЕЛИ – КИШЕЧНЫЕ ВИРУСЫ



Энтеровирусы устойчивы к 70% спирту, к замораживанию, действию ультразвука, поверхностно-активным веществам и детергентам. Прогревание при температуре 50°C и выше, высушивание, УФ – облучение, обработка дезинфицирующими препаратами, обладающими вирулицидным эффектом, приводит к быстрой инактивации энтеровирусов.

НЕОБХОДИМО:

- ▶ Воспитывать у себя привычку обязательно мыть руки перед едой и после туалета.
- ▶ Коротко стричь ногти, не допуская скопления грязи под ними.
- ▶ Воду для питья употреблять кипяченую, бутилированную или из питьевого фонтанчика с системой доочистки водопроводной воды.
- ▶ Овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы употреблять только после мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком; разливное молоко кипятить; творог, приготовленный из сырого молока или развесной, лучше употреблять только в виде блюд с термической обработкой.



Комитет
здравоохранения
Администрации
города Тюмени

Менингит

Менингитом в медицине называется воспалительный процесс, проходящий в оболочке головного мозга, которая располагается между черепной коробкой и непосредственно головным мозгом. Отличается скоротечностью и может за несколько часов привести пациента к летальному исходу. При этом инкубационный период менингита может длиться от 4 до 7 дней, поэтому первые признаки этого опасного заболевания должен знать каждый.



Серозный менингит – основная клиническая форма ЭВИ

Инкубационный период: 2-8 дней.

t° 38-39 $^{\circ}$ C, недомогание, сильная головная боль, больше в височно-лобных областях, многократная рвота, светобоязнь, адинамия, вялость, сонливость.

Клиническим ядром является **гипертензионно-гидроцефальный**



Серозный

Вызывают вирусы



Гнойный

Вызывают бактерии




Серозный + гнойный

Вызывают вирусы и бактерии


Последствия менингита

Арахноидит – аутоиммунное воспалительное поражение паутинной оболочки мозга, приводящее к образованию в ней спаек и кист.




Арахноидит

Процесс инфицирования



Возбудители менингита проникают в организм чаще через кишечник и носоглотку.



Затем они попадают в кровь. Очаг инфекции располагается в области головы и сосудах мозга.



А затем возбудители проникают в спинно-мозговую жидкость.

Парез – неврологический синдром, снижение силы, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы.

Паралич – это дисфункция мышц, полное или частичное отсутствие способности сокращаться. Паралич не является самостоятельным заболеванием, а является симптомом или осложнением основного заболевания или состояния организма.

